

FICHA TÉCNICA

RATOKILL GS

Venda Livre

1. Identificação do Produto

Nome Comum: Brodifacoum

Composição Química: 3-[3-[4-(4-bromofenil)fenil]-1,2,3,4-tetraidronaftalen-1-il]-4-hidroxicromen-2-ona

Categoria: Raticida Cereais

Registro no Ministério da Saúde: M.S 3.2781.0071

Aspecto: Sólido

Cor: Azul Claro a Azul Escuro

2. Composição

Brodifacoum.....0,005% p/p
Atrativo, Desnaturante, Diluente, Corante, Solvente, Agente Formador de Filme e Conservante
.....q.s.p. 100% p/p

3. Indicações de Uso

O Ratokill GS é eficaz contra Ratos (*Rattus rattus*), Ratazanas (*Rattus norvegicus*) e Camundongos (*Mus musculus*).

4. Instruções de Uso

Colocar os grãos dentro de caixas porta-isca próximo às tocas e em outros locais onde os roedores vivem e transitam. Após a ingestão os roedores morrem no período médio de 3 a 5 dias. Verificar após uma semana e reaplicar o Ratokill GS nos locais onde as iscas foram consumidas.

5. Precauções

CUIDADO! PERIGOSA A SU A INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE! CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Só utilizar em lugar de difícil acesso



Insetimax

a crianças e animais domésticos. Durante o manuseio, usar luvas e evitar contato com a pele, boca e olhos. Não aplicar em tubulações de ar ou fontes de ventilação que possibilitem a liberação do rodenticida no ambiente. As mulheres grávidas não podem manipular o rodenticida. Conservar o local desratizado em perfeita condição de limpeza. Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Aos aplicadores, cumprir a exigência de uso adequado do EPI's.

6. Primeiros Socorros

Em caso de contato com os olhos e/ou pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabonete. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e consulte imediatamente o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIAT) ou um médico levando a embalagem ou o rótulo do produto.

7. Indicação para Uso Médico

Grupo Químico: Cumarínico

Nome Comum: Brodifacoum

Antídoto/Tratamento: Vitamina K1 e Tratamento sintomático.

Telefone de Emergência: (16) 3663-1000

Centro de Informações Toxicológicas - CIT/SP: 0800 771 3733

8. Armazenamento

Conservar o produto sempre em sua embalagem original em local seco, ventilado e temperatura ambiente.

9. Apresentações

Caixa com 12 pacotes com 40 unidades de 25g

Caixa com 4 pacotes com 40 unidades de 25g

Barrica com 200 unidades de 25g





Insetimax



Escaneie
nosso QRCode
e descubra
mais em
nosso site



[instagram.com/insetimax/](https://www.instagram.com/insetimax/)



[facebook.com/Insetimax/](https://www.facebook.com/Insetimax/)



[youtube.com/@InsetimaxIndustriaQuimica](https://www.youtube.com/@InsetimaxIndustriaQuimica)

www.insetimax.com.br

INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

Rua Adelaide Zangrande, 141-A | Distrito Industrial Tuffy Mafud

CEP: 14684-178 | Jardinópolis – São Paulo – Brasil

CNPJ: 05.328.961/0001-43

AFE – Anvisa Nº 3.02781-6

Tel.: (16) 3663-1000 / (16) 3663-1011

E-mail: contato@insetimax.com.br

Site: www.insetimax.com.br

SAC: 0800 940 1018