

FICHA TÉCNICA

RATOKILL ISCA GRANULADA

Venda Livre

1. Identificação do Produto**Nome Comum:** Brodifacoum**Composição Química:** 3-[3-[4-(4-bromofenil)fenil]-1,2,3,4-tetraidronaftalen-1-il]-4-hidroxicromen-2-ona**Categoria:** Raticida Granulado**Registro no Ministério da Saúde:** M.S 3.2781.0001**Aspecto:** Granulado**Cor:** Rosa Claro a Rosa Escuro**2. Composição**

Brodifacoum..... 0,005% p/p
Atrativo, Desnaturante, Agente Amaciante, Aglutinante, Corante, Conservante, Diluente e Solvente
.....q.s.p. 100% p/p

3. Indicações de Uso

O Ratokill Isca Granulada é eficaz contra Ratos (*Rattus rattus*), Ratazanas (*Rattus norvegicus*) e Camundongos (*Mus musculus*).

4. Instruções de Uso

Colocar de 2 a 3 pacotes de 25g de Ratokill Isca Granulada em um recipiente plástico ou porta iscas próximo as tocas e em outros locais onde os roedores vivem e transitam. Após a ingestão, os roedores morrem a partir do 3º dia. Os pontos de iscagem devem ser inspecionados após 7 a 10 dias para verificação do consumo e remanejamento nos locais onde as iscas não foram consumidas. Quando todas as iscas de um ponto são consumidas, é indício de que a quantidade foi insuficiente, aumentar a quantidade de iscas nesse local.



Insetimax

5. Precauções

CUIDADO! PERIGOSA A SU A INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE! CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais domésticos. Durante o manuseio, usar luvas e evitar contato com a pele, boca e olhos. Não aplicar em tubulações de ar ou fontes de ventilação que possibilitem a liberação do rodenticida no ambiente. As mulheres grávidas não podem manipular o rodenticida. Conservar o local desratizado em perfeita condição de limpeza. Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Aos aplicadores, cumprir a exigência de uso adequado do EPI's.

6. Primeiros Socorros

Em caso de contato com os olhos e/ou pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabonete. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e consulte imediatamente o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIAT) ou um médico levando a embalagem ou o rótulo do produto.

7. Indicação para Uso Médico

Grupo Químico: Cumarínico

Nome Comum: Brodifacoum

Antídoto/Tratamento: Vitamina K1 e Tratamento sintomático.

Telefone de Emergência: (16) 3663-1000

Centro de Informações Toxicológicas - CIT/SP: 0800 771 3733

8. Armazenamento

Conservar o produto sempre em sua embalagem original em local seco, ventilado e temperatura ambiente.



Insetimax

9. Apresentações

Caixa com 15 pacotes com 40 unidades de 25g

Caixa com 15 pacotes com 40 unidades de 25g

Barrica com 400 unidades de 25g



Escaneie
nosso QRCode
e descubra
mais em
nosso site



[instagram.com/insetimax/](https://www.instagram.com/insetimax/)



[facebook.com/Insetimax/](https://www.facebook.com/Insetimax/)



[youtube.com/@InsetimaxIndustriaQuimica](https://www.youtube.com/@InsetimaxIndustriaQuimica)

www.insetimax.com.br

INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

Rua Adelaide Zangrande, 141-A | Distrito Industrial Tuffy Mafud

CEP: 14684-178 | Jardinópolis – São Paulo – Brasil

CNPJ: 05.328.961/0001-43

AFE – Anvisa Nº 3.02781-6

Tel.: (16) 3663-1000 / (16) 3663-1011

E-mail: contato@insetimax.com.br

Site: www.insetimax.com.br

SAC: 0800 940 1018