

FICHA TÉCNICA

LARV-MAX

Venda Restrita a Instituições ou Empresas Especializadas

1. Identificação do Produto

Nome Comum: Piriproxyfen

Composição Química: 4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyl ether

Categoria: Larvicida Líquido (*Suspensão Concentrada*)

Registro no Ministério da Saúde: M.S 3.2781.0072

Aspecto: Líquido Viscoso

Cor: Branco a Bege Claro

2. Composição

Piriproxyfen.....20% p/p

Dispersante, Atenuador de Espuma, Umectante, Conservante, Desnaturante, Espessante e Veículo.....80% p/p

3. Indicações de Uso

O Larv-Max é um produto, elaborado com Piriproxyfen, eficaz contra larvas de Mosquitos (*Aedes aegypti* e *Culex Quinquefasciatus*), Larva de Mosca (*Musca domestica*) e Larva de Cascudinho (*Alphitobius diaperinus*).

4. Instruções de Uso

Para controle de larvas (*Aedes aegypti*, *Culex Quinquefasciatus*, *Musca domestica* e *Alphitobius diaperinus*): Diluir 25ml de Larv-Max em 10 litros de água para 200 m² de área. Aplicar uniformemente com auxílio de um pulverizador costal ou manual, utilizando ponta leque, ou utilizando um atomizador, nos pontos foco onde as larvas se encontram, tais como lamina d'água, pneus, garrafas e recipientes com acúmulo de água parada, efluentes de esgoto e lixo. Repetir a operação 7 a 10 dias após a primeira aplicação ou quando houver a infestação de larvas de mosquitos



Insetimax

5. Precauções

CUIDADO! PERIGOSA A SU A INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE! CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Ventilar ambiente e aguardar total secagem do produto aplicado antes de permitir reentrada de pessoas e animais domésticos ao ambiente tratado. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e respiratória. Após a aplicação realizar a aeração dos locais tratados, reduzindo a incidência de resíduos do ativo em suspensão no ambiente. Aos aplicadores, cumprir a exigência de uso adequado do EPI's.

6. Primeiros Socorros

Em caso de contato com os olhos e/ou pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabonete. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e consulte imediatamente o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIAT) ou um médico levando a embalagem ou o rótulo do produto.

7. Indicação para Uso Médico

Grupo Químico: Éter Piridiloxipropílico

Nome Comum: Piriproxyfen

Antídoto/Tratamento: Não há antídoto específico e Tratamento sintomático.

Telefone de Emergência: (16) 3663-1000

Centro de Informações Toxicológicas - CIT/SP: 0800 771 3733

8. Armazenamento

Conservar o produto sempre em sua embalagem original em local seco, ventilado e temperatura ambiente.



Insetimax

9. Apresentações

Caixa com 12 unidades de 1L (*Dosador*)

Caixa com 24 unidades de 100ml

Caixa com 12 unidades de 100ml



Escaneie
nosso QRCode
e descubra
mais em
nosso site



[instagram.com/insetimax/](https://www.instagram.com/insetimax/)



[facebook.com/Insetimax/](https://www.facebook.com/Insetimax/)



[youtube.com/@InsetimaxIndustriaQuimica](https://www.youtube.com/@InsetimaxIndustriaQuimica)

www.insetimax.com.br

INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

Rua Adelaide Zangrande, 141-A | Distrito Industrial Tuffy Mafud

CEP: 14684-178 | Jardinópolis – São Paulo – Brasil

CNPJ: 05.328.961/0001-43

AFE – Anvisa Nº 3.02781-6

Tel.: (16) 3663-1000 / (16) 3663-1011

E-mail: contato@insetimax.com.br

Site: www.insetimax.com.br

SAC: 0800 940 1018

Versão: REV06 – 24/07/2026